



กัลปพฤกษ์

ชื่อพื้นเมือง	กานส์ (เขมร – สุรินทร์) ชัยพฤกษ์ (ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Cassia bakeriana</i> Craib
ชื่อวงศ์	LEGUMINOSAE - CAESALPINOIDEAE
ชื่อสามัญ	Kanlapa phruek Pink Cassia, Pink Shower
การกระจายพันธุ์	พบตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก
การขยายพันธุ์	เพาะเมล็ด
ลักษณะ	<p>ต้น ไม้ต้นผลัดใบช่วงสั้น</p> <p>ใบ ใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 5-7 คู่ รูปขอบขนาน กว้าง 1.5-3 ซม. ยาว 6-8 ซม.</p> <p>ดอก ออกเป็นช่อ ดอกย่อยสีชมพู เริ่มบานสีจะจางลงเรื่อย ๆ จนถึงสีขาว กลีบดอกมี 5 กลีบ รูปไข่ กว้าง 1-2.5 ซม. ยาว 3.5-4.5 ซม.</p> <p>ผล เป็นฝักสีน้ำตาลอมเทา รูปทรงกระบอก ยาว 30-40 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. มีขนนุ่ม สีเทา หนาแน่น ฝักหนึ่งมี 30-40 เมล็ด</p> <p>เมล็ด ค่อนข้างกลม สีน้ำตาลเป็นมัน รูปไข่ รูปรี ถึงรูปขอบขนาน กว้าง 6-7 ซม. ยาว 0.8-11 ซม.</p>
นิเวศวิทยา	พบตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณแล้ง ที่ระดับความสูง 300 – 1,000 เมตร ออกดอกติดผลช่วงเดือน ม.ค. – มิ.ย.
ประโยชน์	<p>- ข้อมูลจากเอกสาร เนื้อไม้และเปลือกให้น้ำฝาดนำไปพอกหนัง ฝักใช้เป็นยาระบายอย่างอ่อน ทำให้อาเจียนถ่ายพิษไข้ แก้อหวนต์</p> <p>- ข้อมูลพื้นบ้าน คนสมัยก่อนใช้กินกับหมาก</p>

